

Aricia cramera Eschscholtz, 1821. Sin. *Aricia agestis* subsp. *cramera*

Rogeta d'esteperol (ca.), Morena Serrana (es.), Brown argus (en.)

Distribució. Marroc, Algèria, Tunísia, Illes Canàries, Península Ibèrica. A les Illes Balears es troba a Mallorca i Menorca.

Descripció. Imago. Papallona de mida reduïda, d'uns 14 mm d'envergadura, de color marró fosc amb taques taronges als marges de les ales. Les femelles tenen aquestes taques més grans i més visibles que els mascles i són de mida més grossa. **Eruga.** 14 mm de llargada. Verdes amb marge blanc i rosa. Cap retràctil. **Crisàlide.** 10 mm. Color ocre clar amb zones verdoses. Es fixen a la fullaraca amb una petita cintura de seda toràctica.



Plantes nutrícies de les erugues. Les larves de la segona generació viuen associades a formigues sobre cistàcies (estepes); geraniàcies (geranis), i compostes del gènere *Centaurea*.

***Aricia cramera* a Menorca**

Representativitat dins del BMS. Només representa l'1% de les espècies observades al BMS, però no es tracta d'una espècie rara. El BMS va aportar la primera cita d'aquesta espècie a Menorca l'any 2003. Es confon fàcilment amb altres espècies.

Període de vol. Polivoltina. Presenta diverses generacions solapades des del març fins l'octubre però la seva màxima abundància és el mes de juny. Hiverna com a larva.

Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia, marges de camins. La comunitat on més s'ha trobat dins del BMS són les brolles d'estepes i brucs. Vol baix i curt. Mostra preferència per cards del gènere *Eryngium*, tant *E. campestre* com *E. maritimum*. També per *Limonium*.



Espècies semblants presents a Menorca. Pot confondre's amb les femelles de *P. icarus*, però aquestes tenen dues taques negres a la zona basal del revers de les ales anteriors mentre que *A. cramera* només en té una.

Aricia cramera

