

## *Lampides boeticus* Linnaeus, 1767

Blaveta de la ginesta (cat.); Canela estriada (cast.); Long tailed blue (eng.)

**Distribució.** NO Àfrica, Illes Canàries, illes mediterrànies i Europa fins a la latitud 54° N (N d'Alemanya).

**Descripció. Imago.** 30-35 mm d'envergadura alar. Presenten dimorfisme sexual. Els mascles són blau violaci. En els marges de les ales hi té una fina franja marró fosc. Les femelles tenen els marges alars anteriors foscos mentre que els marges de les posteriors están més o menys tenyits de blau cap a la base. A l'angle anal hi ha un punt negre i un petit apèndix caudal en els dos sexes. El revers de les ales és marró pàl·lid, amb una sèrie de línies blanques ondulades, una d'elles més ampla a la zona postdiscal, i dos punts negres envoltats d'un verd metàl·lic i taronja a la base de les cues. **Eruga.** 15 mm de llargada. Color verd pàl·lid o groguenc, amb una ratlla fosca en el dors i molts puntes foscos o blancs. **Crisàlide.** 12 mm. Color marró clar amb taques fosques. Crisaliden embolcallades amb una fulla o dins de les beines de la planta nutrícia.


**Plantes nutrícies de les erugues.** Són molt polífagues, però a causa de la dieta antòfaga (s'alimenten de flors) de les larves, les femelles només ovipositen en plantes que comencen a florir. L'alfals (*Medicago sativa*), el fesol bord (*Pisum sativum*), la ginesta (*Spartium junceum*) i altres lleguminoses, en són alguns exemples. Poden arribar a crear algun problema als conreus de lleguminoses, ja que les larves poden viure o fins i tot crisalidar a l'interior de les beines de la planta nutrícia.

### *Lampides boeticus* a Menorca


**Representativitat dins del BMS.** Espècie amb molt poca representació, fins al moment, en el BMS.

**Període de vol.** Espècie migradora subtropical, polivoltina. No entra en diapausa. Anualment arriba des d'Àfrica o el sud de la Península Ibèrica, però possiblement sobreviu l'hivern a l'illa regularment. Els primers exemplars s'acostumen a detectar al juny-juliol, després se succeeixen diverses generacions que permeten que les densitats poblacionals siguin importants a finals d'estiu i a la tardor.

**Hàbitat i comportament.** Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. Prats i àrees de vegetació baixa. Els recomptes màxims dins el BMS s'han produït a les dunes mòbils. Presenta un vol ràpid i irregular, i els mascles mostren tendència al comportament de *hilltopping*.



**Espècies semblants presents a Menorca.** Es pot confondre amb *Leptotes pirithous*, aquesta última lleugerament més petita i amb absència de la banda blanca postdiscal al revers de les ales posteriors. L'anvers de les ales d'ambdues espècies és marronós amb difusió de blau, però *L. pirithous* presenta també taques marrons més fosques la qual cosa no succeeix a *L. boeticus*.



*Lampides boeticus*

