

## *Leptotes pirithous* Linnaeus, 1767 Sin. *Syntarucus pirithous*

Blaveta del romaní (ca.); Gris estriada (es.); Lang's Short-tailed Blue (en.)

**Distribució.** NO Àfrica, Europa mediterrània incloses les illes, Península Ibèrica, SO de França, SO Balcans. Absent a les Illes Canàries.

**Descripció. Imago.** 26 mm d'envergadura. Amb un discret dimorfisme sexual. El mascle té l'anvers de les ales de color marró violaci amb els marges foscos, amb una petita cua a l'angle anal. Presenta dos punts marginals foscos a les ales posteriors. El revers és de color canyella, amb unes bandes transversals alternant bandes clares i fosques i dos punts negres rodejats de verd metal·litzat a l'angle anal de les ales posteriors. La femella és similar, lleugerament més gran i amb zones clarament violàcies a la base de l'anvers de les ales anteriors. **Eruga.** 9-10 mm. Molt tranquil·les, es mantenen sobre les flors de la planta nutrícia. Poden ser de color groc o verdós, amb molts puntets més clars i curta pilositat. **Crisàlide.** 8-9 mm. De color marró clar amb taques fosques. Es troba a la fullaraca sense cap protecció. A vegades fixades per una dèbil cintura de seda.



**Plantes nutrícies de les eruges.** Són molt polífagues, però a causa de la dieta antòfaga de les larves (mengen flors), les femelles només posen ous en plantes que comencen a florir. Les plantes preferides són l'alfals (*Medicago sativa*) i el romaní (*Rosmarinus officinalis*). Altres gèneres freqüentment utilitzats són *Melilotus* i *Trifolium* (trèvols).

### *Leptotes pirithous* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** Espècie poc comuna, representa el 0,2% de les observacions del BMS.

**Període de vol.** Espècie migradora subtropical, polivoltina. Anualment la majoria d'exemplars arriben des d'Àfrica o el sud de la Península Ibèrica. Els primers s'acostumen a detectar al maig-juny i es succeeixen diverses generacions fins a la tardor. És especialment abundant a l'agost, setembre i octubre.

**Hàbitat i comportament.** Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. És comuna a les zones litorals. Els recomptes màxims dins el BMS s'han produït als cursos d'aigua permanent i al salicorniar, on ha estat observada posant els ous sobre la verdolaga de la mar (*Halimione portulacoides*).



**Espècies semblants presents a Menorca.** Es pot confondre amb *Lampides boeticus*, aquesta última lleugerament més grossa i amb presència d'una banda blanca postdiscal al revers de les ales posteriors que no es presenta a *L. pirithous*. L'anvers de les ales d'ambdues espècies és marronós amb difusió de blau però *L. pirithous* presenta també taques marrons més fosques, la qual cosa no succeeix a *L. boeticus*.



*Leptotes pirithous*



Fotografia: Jordi Jubany