

## *Lycaena phlaeas* Linnaeus, 1761.

Rogeta (ca.) Manto bicolor (es.), Small cooper (en.)

**Distribució.** Àmpliament distribuïda i comuna. Canàries, nord i centre d'Àfrica, Europa, N. Amèrica, Àsia temperada i Japó.

**Descripció. Imago.** 26 mm d'envergadura. Ales anteriors taronges amb punts negres i marge exterior quasi negre. Ales posteriors de color marró-grisenc amb una franja al marge de color taronja. Presenta a l'angle anal un petit apèndix. El revers de les ales posteriors és gris clar. **Eruga.** 13-16 mm de llargada. Curtes i robustes, de color verd amb abundants puntets blancs. Presenta una certa pilositat rosada. Són hivernants i es mouen poc. Viuen al revers de les fulles. **Crisàlide.** 10 mm. Color blanquinós amb taques negres. Presenta un abultament toràctic. Es troba a la fullaraca i poden observar-se de l'abril fins al setembre.



**Plantes nutrícies.** Polygonàcies.

### *Lycaena phlaeas* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** Espècie comuna. En el BMS representa un 2,8% de les espècies observades, però ocupa la desena posició en abundància.

**Període de vol.** Es poden observar en vol del març fins l'octubre, amb diverses generacions solapades. Presenta un pic d'abundància a la segona quinzena de juny.

**Hàbitat i comportament.** Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. Es troba als pradells i zones obertes i assolellades com camps abandonats, voreres de camins o arenals. És una espècie amb forta tendència antròpica, és a dir, lligada a l'activitat humana, però la seva capacitat



dispersiva i colonitzadora les fa aparèixer en qualsevol tipus d'ambient. Les papallones es poden veure fàcilment libant sobre àrnica (*Pulicaria odora*) o altres compostes. Li agraden molt els cards (*Eryngium*, *Carlina*), i l'olivarda (*Dittrichia viscosa*)

**Espècies semblants presents a Menorca.** No n'hi ha.

# *Lycaena phlaeas*

