

Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761.

Rogeta (ca.) Manto bicolor (es.), Small cooper (en.)

Distribució. Àmpliament distribuïda i comuna. Canàries, nord i centre d'Àfrica, Europa, N. Amèrica, Àsia temperada i Japó.

Descripció. Imago. 26 mm d'envergadura. Ales anteriors taronges amb punts negres i marge exterior quasi negre. Ales posteriors de color marró-grisenc amb una franja al marge de color taronja. Presenta a l'angle anal un petit apèndix. El revers de les ales posteriors és gris clar. **Eruga.** 13-16 mm de llargada. Curtes i robustes, de color verd amb abundants puntets blancs. Presenta una certa pilositat rosada. Són hivernants i es mouen poc. Viuen al revers de les fulles. **Crisàlide.** 10 mm. Color blanquinós amb taques negres. Presenta un abultament toràctic. Es troba a la fullaraca i poden observar-se de l'abril fins al setembre.



Plantes nutrícies. Polygonàcies.

Lycaena phlaeas a Menorca

Representativitat dins del BMS. Espècie comuna. En el BMS representa un 2,8% de les espècies observades, però ocupa la desena posició en abundància.

Període de vol. Es poden observar en vol del març fins l'octubre, amb diverses generacions solapades. Presenta un pic d'abundància a la segona quinzena de juny.

Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. Es troba als pradells i zones obertes i assolellades com camps abandonats, voreres de camins o arenals. És una espècie amb forta tendència antròpica, és a dir, lligada a l'activitat humana, però la seva capacitat



dispersiva i colonitzadora les fa aparèixer en qualsevol tipus d'ambient. Les papallones es poden veure fàcilment libant sobre àrnica (*Pulicaria odora*) o altres compostes. Li agraden molt els cards (*Eryngium*, *Carlina*), i l'olivarda (*Dittrichia viscosa*)

Espècies semblants presents a Menorca. No n'hi ha.

Lycaena phlaeas

