

## *Charaxes jasius* Linnaeus, 1767

Papallona de l'arboç (ca.) Bajá, cuatro colas (es.), Two-tailed Pasha (en.)

**Distribució.** Afrotropical, es troba en una franja costanera en la regió circummediterrània.

**Descripció. Imago.** Papallona de gran mida (75-80 mm d'envergadura) i de vol potent. Per l'anvers és marronosa, amb els marges d'un taronja viu que esdevé gradualment de color groguenc a mida que s'apropa a l'angle anal de les ales posteriors on, a més, presenta dues cues. Pel revers es combinen taronges i blancs amb tons marronosos grisencs i vermellinosos amb unes petites taques blaves. **Eruga.** 43-45 mm de llargada. Cap amb quatre apèndixs vermells inclinats cap enrere. Cos verd amb dues línies laterals grogues, nombrosos punts blancs que donen a la pell un aspecte rugós i dos ocells dorsals grocs amb el centre blau. Viuen a l'anvers de les fulles d'arboç damunt un coixinet de seda que teixeixen al voltant del nervi central. Aquesta fulla de repòs es manté durant tot el desenvolupament i només es mouen una curta estona per anar a menjar a les fulles del voltant i tornar al mateix punt de repòs. Les erugues solen marxar de l'arboç per a crisalidar amagades entre la vegetació, penjades cap per avall. **Crisàlide.** 25 mm. La crisàlide és curta i gruixuda, de color verd. Es troben penjades cap per avall.



**Plantes nutrícies de les erugues.** S'alimenten exclusivament d'arboçer (*Arbutus unedo*).

### *Charaxes jasius* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** Es trobava rarament i de manera puntual fins que es va afegir l'estació de Santa Catalina a la xarxa, on es veuen més representats els ambients boscosos. Es pot considerar espècie poc comuna.

**Període de vol.** Bivoltina. La primera generació, més escassa, es troba en vol al maig-juliol i la segona, molt més abundant, de l'agost a l'octubre. Els pics poblacionals estan separats unes deu setmanes que és el temps necessari per completar el cicle. Hiverna en estadi larval.

**Hàbitat i comportament.** Boscos tancats, alzinar i marines de bruc amb arboç. Els mascles són molt



territorials i fan *hilltopping* durant les hores centrals del dia, el que fa que puguin observar-se lluny de les poblacions reproductores. Els adults s'alimenten de fruites madures, exsudats d'arbres i excrements de mamífers. La segona generació sent una gran atracció per les figues.

**Espècies semblants presents a Menorca.** No n'hi ha.

*Charaxes jasius*

