

## *Pararge aegeria* Linnaeus, 1758

Papallona del gram (ca.); Maculada, Mariposa de los muros (es.); Speckled Wood (en.)

**Distribució.** N Àfrica, Europa, Turquia i Àsia temperada.

**Descripció. Imago.** 35-45 mm. Cara superior de les ales marronosa amb cel·les taronges, arreu en les anteriors i formant una franja postdiscal en les posteriors. Aquestes parts ataronjades contenen els ocells, un de subapical en cadascuna de les ales anteriors i tres de postdiscals en les franges de les posteriors. Pel revers, les ales anteriors segueixen el disseny de la cara superior amb un contrast de colors no tan marcat, i les posteriors, més críptiques, amb aigües de colors que s'enfosqueixen i s'aclareixen. Postdiscalment presenta una línia poc nítida d'ocells. **Eruga.** 28 mm. Color verd amb pilositat blanquinosa i línies longitudinals de colors verd fosc, groc i negre. Foma de fus amb el cap esfèric i dues puntes a l'extrem abdominal. Hivernen en aquest estadi. **Crisàlide.** 17 mm. Són de color verd i es pegen mitjançant un coixinet de seda.



**Plantes nutrícies de les eruges.** Vàries espècies de gramínies (*Brachypodium sylvaticum*, *Cynodon dactylon*,...)

### *Pararge aegeria* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** És l'espècie més abundant de Menorca, amb una representativitat en el BMS del 23% de les espècies observades.

**Període de vol.** Espècie polivoltina. Amb generacions successives que es van intercalant. Vola quasi totes les èpoques de l'any. Hiverna majoritàriament com a larva i pupa, però també se la pot veure volant els dies assolellats de l'hivern i s'han arribat a observar còpules al mes de gener. És molt abundant de març a octubre, amb una davallada a l'agost i posterior recuperació al setembre. Té el seu pic màxim d'abundància a finals de maig - principis de juny.

**Hàbitat i comportament.** Boscos tancats. Espècie típicament forestal. Es troba sempre als marges de camins que travessen boscos i bardisses. És una espècie ombrívola. Té un comportament molt territorial.



**Espècies semblants presents a Menorca.** Es pot confondre amb *Lasiommata megera*, però aquesta es troba en ambients oberts mentre que *Pararge* és d'ambients més ombrívols. Quant a les diferències morfològiques, la cara inferior de l'ala posterior de *P. aegeria* és de color marró amb marbrejat groguenc i vermellós, en canvi a *L. megera* és de color grisenc amb línies transversals fosques sinuoses, amb una sèrie d'ocells postdiscals petits, formats per un punt negre central pupil·lat de blanc, voltat d'un sol anell. A la cara superior de l'ala posterior *P. aegeria* presenta una taca taronja, mentre que *L. megera* presenta tota una banda postdiscal taronja.

*Pararge aegeria*

