

Pyronia cecilia Vallantín, 1894

Grogueta (ca.) , Lobito jaspeado (es.), Southern Gatekeeper (en.)

Distribució. Marroc, Algèria, Península Ibèrica excepte serralada cantàbrica, Balears, part de Pirineus francesos i Alps marítims, Itàlia, SE Balcans, O Grècia, NO Turquia.

Descripció. Imago. Cara superior de les ales de color taronja amb el marge de les ales marronós. Un ocel amb doble pupil·la blanca en cada ala anterior i les ales posteriors sense ocells. Pel revers, les ales posteriors tenen tonalitats clares on es combinen els grisos clars amb els marronosos i on destaca una estreta franja blanquinosa discal. Fort dimorfisme sexual: mascles amb androcònia de color marró fosc, partida per les venes ataronjades a les ales anteriors, i de mida molt més reduïda que la femella. **Eruga.** Color groc pàl·lid finament puntejat de negre amb cinta lateral marró clar prop del cap i més fosca cap a la bifurcació caudal. **Crisàlide.** Color marró clar brillant.

Plantes nutrícies de les eruges. Diverses espècies de gramínies, sobretot *Brachipodium retusum*.



Pyronia cecilia a Menorca

Representativitat dins del BMS. Espècie comuna a Menorca. Dins el BMS representa el 5,6% de les espècies observades.

Període de vol. Univoltina, des de finals de maig fins a finals d'agost. Primer apareixen els mascles i una mica més tard les femelles. Hiverna com a larva.

Hàbitat i comportament. Boscoberts i marines. Zones càlides i seques amb vegetació baixa. L'hàbitat on més s'ha observat dins el BMS són les dunes amb vegetació i en segon lloc, però amb una abundància molt inferior, es troba en la brolla d'estepes i brucs. Presenta un vol baix i un comportament molt tímid; de seguida s'amaga a les ombres o sota d'una mata. Els adults s'alimenten de *Limonium*, *Scabiosa*, *Pulicaria* i *Carlina*, de floració estival.

Espècies semblants presents a Menorca. Pot ser confosa amb *Maniola jurtina* per un observador poc experimentat, però es donen diferències importants entre ambdues espècies. Una diferència clara és que *M. jurtina* té només un punt blanc a l'ocel de l'àpex alar mentre que *P. cecilia* té dos punts blancs dins aquest ocel. *M. jurtina* és de mida més grossa.



Pyronia cecilia

