

Pieris rapae Linnaeus, 1758

Blanqueta de la ravenissa (ca.), Blanquita de la col (es.), Small white (en.)

Distribució. Àmpliament distribuïda i comuna. N Àfrica, Europa i Àsia. Ben establerta i molt abundant a Balears.

Descripció. Imago. 45-50 mm d'envergadura alar. La cara superior de les ales és de color blanquinós amb taques negres: dues a les ales anteriors i una de costal a les posteriors. Té el marge apical de les ales superiors de color negre. La cara inferior de les ales posteriors és de color groguenc i la de les anteriors és blanca amb només el marge superior tacat de groc. La divergència sexual es troba en els dos punts negres que tenen les femelles a les ales superiors; el mascle no les té o només en té una. **Eruga.** 25-30 mm de llargada. Verdosa amb un fi puntejat negre, línia dorsal groguenca i latero-ventral de punts blancs o groguencs separats entre si. No són gregàries i es poden trobar exemplars de diverses femelles o de diferents postes en la mateixa planta. **Crisàlide.** 23-25 mm. Penja de parets, pedres o troncs mitjançant un fil de seda toràcica. Aspecte angulós i de color verd o ocre amb sortints i arestes marrons.

Plantes nutrícies de les eruges. Crucíferes, de les quals pot arribar a convertir-se en plaga, tant en conreus com en plantes silvestres.



Pieris rapae a Menorca

Representativitat dins del BMS. Es tracta d'una espècie molt abundant a l'illa. És la cinquena més abundant dins la xarxa BMS i representa el 8,7% de les espècies observades.

Període de vol. Polivoltina. És un dels primers ropalòcers que apareix en vol a la primavera i es manté fins ben entrada la tardor. L'abundància màxima es dona cap a finals de juny i principis de juliol. Hiverna com a crisàlide. Presenta fortes tendències migratòries.

Hàbitat i comportament. Els ambients on es troba són boscos oberts, marines, camps i horts. L'hàbitat on es troba amb més freqüència a Menorca és a les màquies d'ullastre i llentiscle.

Espècies semblants presents a Menorca. Els exemplars de Menorca presenten una talla més gran de l'habitual, especialment a principi de temporada quan es pot arribar a confondre amb *Pieris brassicae*. A mesura que avança la temporada, les generacions són de menor mida i es van diferenciant força de *P. brassicae*, sobretot pel to groguenc del revers que es va fent més evident. Un altre tret diferencial és la taca negra, que és més intensa, més extensa i arriba més avall pel marge de l'ala en el cas de *P. brassicae*.



Pieris rapae

