

Pontia daplidice Linnaeus, 1758

Papallona de la mostassa (ca.), Blanquiverdosa (es.), Bath white (en.)

Distribució. NO d'Àfrica, Illes Canàries, Península Ibèrica, França i zones d'Alemanya. Present a les Balears.



Descripció. Imago. 40-46 mm d'envergadura. L'anvers de les ales és de color blanc amb una taca discal negra i àpex negres amb taques blanques, l'anvers de les ales posteriors és blanc en els mascles i les femelles tenen taques negres al llarg del marge de l'ala. El revers de les ales anteriors té la taca discal i l'angle apical verd. El revers de les ales posteriors és verd amb un punt discal blanc i dues franges blanques. **Eruga.** 30 mm de llargada. De color gris verdós, amb quatre franges grogues, tot el conjunt esquitxat de puntets negres. **Crisàlide.** 22 mm. Forma angular, de color verd o marró rosat amb les arestes groguenques, amb una línia lateral abdominal. Es fixen per un cinturó de seda toràcica.

Plantes nutrícies de les eruges. Crucíferes diverses com morrissà bord (*Lobularia maritima*), ravenissa blanca (*Diplotaxis erucoides*) i *Lepidium* spp. En indrets costaners la ravenissa de platja (*Cakile maritima*).

Pontia daplidice a Menorca

Representativitat dins del BMS. La seva representació en el BMS es troba al voltant del 0,4% de les espècies comptades dins la xarxa. Aquests valors d'abundància relativament baixos segurament no es corresponen exactament amb la realitat. La causa és el baix nombre de camps de cultiu prospectats en el BMS de Menorca.

Període de vol. Espècie polivoltina, vola de març a octubre. És una espècie migradora, per la qual cosa el nombre d'exemplars pot augmentar considerablement d'un dia a un altre. Hiverna com a crisàlide.



Hàbitat i comportament. Camps i horts. Freqüenta àrees obertes, zones ruderals càlides i àrides. Presenta un vol ràpid prop del terra.

Espècies semblants presents a Menorca. No n'hi ha, tot i que es podria arribar a confondre amb altres pièrids.

Pontia daplidice

