

Danaus chrysippus Linnaeus, 1758.

Afrikanischer Monarch

Verbreitung. Der Falter kommt auf den Kanaren, in Afrika, der Türkei, Australien und Tropisch Asien vor. Verbreitet vor allem in Afrika und im tropischen Asien, seit längerem auf den Kanaren, seit wenigen Jahrzehnten jedoch auch an wenigen isolierten Stellen im südlichen Mittelmehrraum (in Küstennähe, es ist umstritten, ob es sich dabei um dauerhafte Populationen handelt). Der Falter neigt zu Wanderungen und kann so auch in Gebieten vorkommen, wo er nicht bodenständig ist.

Beschreibung.Imago. Die Vorderflügel des Schmetterlings tragen eine rotbraune Grundfarbe. Die Flügelspitze ist schwarz und enthält einige weiße Flecken. Die Unterseite von *Danaus chrysippus* ist eine Kopie der Oberseite, jedoch gibt es in der Flügelspitze einen hellbraunen Bereich. Die Hinterflügel von *Danaus chrysippus* sind weiß. Der Flügelrand ist schwarz und birgt einige kleine weiße Flecken. Nahe dem Flügelrand ist ein schmaler brauner Bereich. In der Mitte des Flügels sind einige schwarze Flecken. Die Unterseite ist eine Kopie der Oberseite, jedoch beinhaltet der schwarze Saum nun eine komplette Reihe kleiner, weißer Flecken. Der große schwarze Fleck in der Flügelmitte hat einen weißen Kern. Die **Raupe** ist 33 Millimeter lang. Sie besitzen schwarze und weiße Ringe mit weißen Flecken. Die **Puppe** ist 25 Millimeter lang, grün, kurz und dick, mit einem schwarzen Ring zwischen Bauch und Brust. Auf dem Brust sind goldene Flecken erkennbar.

Futterpflanzen der Raupen. Auf den Balearen sind Raupen auf Seidenpflanzen (*Gomphocarpus fruticosus*) anzutreffen.

Danaus chrysippus a Menorca

Vorkommen nach dem BMS (Überwachungssystem für Schmetterlinge). Nur während der Wanderungen auf Menorca vorkommend. Diese Art ist d.h nicht beobachtet worden.

Flugzeit. Der Falter fliegt in mehreren Generationen. Die Art stammt aus Afrika und ist in den letzten Jahren regelmäßig nach Katalonien gewandert. Die Bevölkerungsspitzen sind vom Ende Juni bis den Herbst hinein am Ebro-Delta zu beobachten. Die seltene Einwanderungen in Menorca kommen dann im Herbst vor.

Lebensraum und Lebensweise. In Katalonien sind die Falter am Ebro-Delta vorkommend. Dort besiedeln sie die Marschländer und fliegen die Hauptflüsse hinauf.

Ähnliche Arten auf Menorca. Keine.

Danaus chrysippus

