

*Coenonympha pamphilus* Linnaeus, 1758

Grogueta petita (ca.) , Níspola (es.), Small heath (en.)

**Distribution.** N Afrique, Europa, Turquia, Moyen Orient.

**Description. Adulte.** Papillon de grandeur réduite, de 25 mm d'envergure. Le dessus des ailes est brun clair, avec un discret ocelle à l'extrémité des ailes antérieures. Leur dessus est brun aussi avec l'extrémité et les bords colorés en gris et un ocelle détaché sur la zone subapical. Le dessous des ailes postérieures est d'une tonalité grise, plus foncée sur la zone de la base avec des ocelles peu visibles ou absents et présente souvent une bande post discal plus claire sur la partie centrale de l'aile postérieure. **Chenille.** 14 mm de long, à peu près. Vertes ou à tons ocres, avec des raies claires et obscures, elles présentent un pointillé blanc. **Chrysalide.** 10 mm. Pendue vers le bas d'une feuille de la plante nourricière. Elles sont courtes, grosses et peuvent être complètement vertes ou avec des tons gris sur la partie inférieure thoracique et le reste coloré de lignes marrons.



**Plantes nourricières des chenilles.** Plusieurs espèces de graminées (*Festuca spp.*, *Axonanthum spp.*, *Poa annua*, entre d'autres).

*Coenonympha pamphilus* a Menorca

**Representativitat dins del BMS.** Espècie escassa a Menorca, dins el BMS representa el 0,8% de les espècies observades.

**Període de vol.** Espècie polivoltina. Mitjançant el BMS s'han detectat dues generacions clares a Menorca. Es pot començar a veure al març - abril fins a finals d'agost o setembre. Part de les larves procedents de la primera generació s'alimenten ràpidament i es transformen en crisàlides i en adults com una segona generació i altres no crisaliden sino que entren en estadi d'hivernació fins a la primavera següent en que crisaliden i són la primera generació de l'any següent.

**Habitat et conduite.** Forêts ouvertes et buissons. Buisson de cistes y bruyères, prairies, marges des chemins, terrains cultivés en abandon et aussi terrains de cultivés non irrigués en actif. Elle vole bas et



reste toujours près du sol en s'arrêtant sur les tiges des graminées. Vol court et peu vif.

**Espècies semblables présentes à Minorque.** Elle peut être confondue avec *Pyronia cecilia* quand elle se trouve avec les ailes pliées mais *C. pamphilus* est plus petite.

*Coenonympha pamphilus*

