


Fitxa 22

S'EMBARCADOR



DADES GEOGRÀFIQUES I FÍSiques:

Municipi: es Mercadal.
Altres topònims: platja de Salaró, Pregondó.
Àrees urbanes associades: no n'hi ha.
Accés: a peu pel Camí de Cavalls des de l'estacionament que es troba associat a la platja de Binimel·là, a la qual s'arriba amb vehicle des de la carretera de Tramuntana des Mercadal.
Orientació de la platja: nord.
Superfície de platja: 2.160 m².
Llargada de platja: 70 m.
Amplada mitjana de la platja: 40 m.
Grau de saturació de la platja: alt en plena temporada.
 Elevada freqüentació d'embarcacions.



Geologia de l'entorn: la cala es troba ubicada entre materials del Permotriàsic, força erosionats, on s'encaixen una sèrie de dunes quaternàries i material al·luvial. Afloraments de la roca subvolcànica anomenada quarsqueratòfir.
Composició del sediment: carbonatat de gra gruixut i colors vermellorsos. El seu origen és força equilibrat, amb domini de litoclastes (61%) i la resta de carbonatats.
Espai natural protegit: inclosa a l'Àrea Natural d'Espècial Interès Me-3, a la Xarxa Natura 2000 i, dins la mar, a la Reserva Marina del Nord de Menorca.

SERVEIS DE PLATJA:

Classificació platges CIM: platja de tipus B (natural amb accés rodar).
Distància a l'estacionament: 1.500 m fins a l'estacionament de Binimel·là.
Servei de socorrisme: no n'hi ha.
Altres serveis: no n'hi ha.

ENTORN I PAISATGE

Es tracta d'una petita platja del nord de Menorca amb un elevat interès paisatgístic. La seva ubicació, en l'espectacular entorn de cala Pregonda, li confereix unes panoràmiques de gran bellesa. No obstant açò, el seu interès ecològic és tan o més gran, ja que aquesta platja conserva un dels sistemes dunars en més bon estat de l'illa ([vegeu foto](#)). Tot i la petita mida del front de costa, el sistema dunar s'estén un quilòmetre terra endins, i presenta un camp de dunes en molt bon estat cap a l'interior, on, a més, es poden observar fàcilment les franges de vegetació típiques d'aquests ecosistemes. Malauradament, no es pot dir el mateix del sector de dunes del costat oriental, força desestructurades pel pas de la gent, i a on es comencen a donar importants processos erosius que donen lloc a la desestructuració del conjunt del sistema. El torrent de Son Ametller romp la platja durant els episodis de pluja intensa. Darrere de la platja es pot veure un petit grup de tamarells que testimonia la seva presència.



Des de l'arena, es poden observar davant de la platja els esculls de Pregondó, unes roques de naturalesa subvolcànica de color ataronjat que prenen unes formes certament peculiars ([vegeu foto adjacent](#)). Darrere aquests esculls, a la dreta de la platja de s'Embarcador i ben arrecerada del vent, hi ha un altre minúscul tros d'arena conegut com platgeta de s'Embarcadoret.



PLANTES I VEGETACIÓ

Dins la platja són habituals les espècies més pioneres, aquelles capaces de viure dins les arenes més mòbils: espinadella (*Salsola kali*), cent nusos de la mar (*Polygonum maritimum*), una petita lletrera (*Euphorbia peplis*) ([vegeu foto esquerra](#)) i *Suaeda spicata*. Més enfora, quan ja es comencen a formar les dunes, apareixen les espècies més

persistents i ja amb una clara vocació de voler estabilitzar l'arena: carc marí (*Eryngium maritimum*), lliuri de platja (*Pancremium maritimum*), lletrera de platja (*Euphorbia paralias*), a les quals prest acompanyen el fenàs de platja (*Elymus farctus*) i el borró (*Ammophila arenaria*), les dues gramínies que més contribueixen a la fixació de l'arena i a la formació de les dunes.



Entre elles van apareixent altres plantes, com el trèvol mascle (*Lotus cytisoides*), el bolitx bord (*Anthemis maritima*), la campaneta de la mar (*Calystegia soldanella*) o també *Echinophora spinosa*, a Menorca una autèntica raresa que només és present a unes poques platges i sempre amb poblacions molt reduïdes, d'un o dos individus.

L'arena que hi ha darrere de la platja s'estén en forma de llengua cap a l'interior i, a mesura que es va allunyant de la costa, les comunitats vegetals van canviant i prenen importància les plantes llenyoses com les savines (*Juniperus phoenicea*) (vegeu foto dreta), la mata (*Pistacia lentiscus*) o l'aladern (*Phillyrea media*), i en aquesta també els tamarells (*Tamarix sp. pl.*), a causa dels torrents i les sèquies que envolten la llengua de dunes.

ANIMALS

Donat que el sistema dunar està prou ben constituït, serà fàcil trobar animals propis d'aquest tipus d'ambient, més cap a l'interior. Els més fàcils de veure són les tortugues de terra (*Testudo hermanni*), força abundants sobre substrats arenosos; també els conills (*Oryctolagus cuniculus*), quan no estan afectats per una de les dues malalties que mantenen molt reduïdes les poblacions a Menorca.

DINS LA MAR

Aquesta cala té un fons totalment heterogeni. A la part de ponent predomina el fons d'arena amb blocs de diverses mides que afavoreixen la presència de bancs de sargs (*Diplodus sargus*), i algun anfós (*Epinephelus marginatus*). A la part de llevant, en canvi, hi predomina el fons de roca amb comunitats d'algues diverses alternant amb fons de posidònia, que en alguns punts arriba pràcticament a la superfície, on conviu amb l'algueró (*Cymodocea nodosa*). L'alga marró *Cystoseira crinita* és molt abundant a aquesta cala (vegeu foto adjacent), on forma unes de les comunitats més extenses i espectaculars de tota l'illa.



Al voltant de l'illot situat al mig de la cala s'observen normalment gran quantitat i varietat de peixos. A més dels sargs i anfosos ja esmentats, s'hi poden veure morenes (*Muraena helena*) (vegeu foto adjacent), roquers (*Symphodus spp.*), saupes (*Sarpa salpa*) i donzelles (*Coris julis*). Des de la creació de la reserva marina del nord de Menorca, la pesca en aquesta zona està restringida i vigilada.



HISTÒRIA I SINGULARITATS

El nom de s'Embarcador fa referència al fet que, antigament, aquesta platja degué funcionar com un petit port de mercaderies. Així ho confirmen les restes arqueològiques romanes del sector occidental de la platja, i els utensilis i materials que s'hi han trobat entre les runes.

Molt temps enrere, abans que els plans de Salairó i Binimel·là es cultivessin, amb tota seguretat, els arenals de Pregondó i de Binimel·là en degueren ser un de sol, amb tota una sèrie d'àrees inundables temporals entremig.