

Cacyreus marshalli Butler, 1898.

Blaveta dels geranis (cat.) Mariposa de los geranios (cast.), Geranium bronze (eng.)

Distribuzione. S. Africa, introdotta nelle Isole Baleari, Spagna, Francia, Belgio e probabilmente in altri paesi dell'Europa del Sud.

Descrizione. Adulti. 30 mm di apertura alare. La superficie anteriore delle ali è di color marrone, con strisce bianche e marroni discontinue sul margin.e. Il rovescio delle ali è marrone molto chiaro con parti scure e abbondanti venature bianche. Nella zona di base delle ali posteriori si trova un punto nero vicino a una piccola appendice.

Bruco. 14 mm di lunghezza. Di color verde pallido, con segni rossi e setole bianche, lunghe e rigide. Gli adulti depongono le uova nei boccioli dei gerani e nel nascere li svuotano, impedendo così la fioritura, oppure seccano i germogli.in un secondo tempo. Può introdursi all'interno degli steli, alimentandosi dall'interno e provocando la morte della pianta.

Crisalide. 12 mm. Di colore e disegni simili a quelli del bruco. Possono svernare e pertanto è possibile trovarle durante tutto l'anno. L'incrisalidamento avviene all'esterno della pianta, nel fogliame, a cui si legano mediante un debole cordoncito di seta.

Piante nutrici dei bruchi. *Geranium spp* e *Pelargonium spp*. Soprattutto i gerani ornamentali..

Cacyreus marshalli a Minorca

Rappresentatività nel BMS. Specie osservata solo puntualmente nei sopralluoghi del BMS; si tratta pertanto di una specie rara nell'ambiente naturale. Si osserva invece frequentemente nei giardini, soprattutto in presenza di gerani.

Periodo di volo. Vista la scarsità di enumerazioni del BMS, a causa della lontananza dei sopralluoghi dalle aree che presentano gerani coltivati, non si dispone della curva di volo; trattasi però di una specie che vola durante quasi tutto l'anno. Di fatto, non entra in chiaro svernamento, e se la stagione invernale è mite, se ne possono vedere esemplari persino in dicembre o febbraio. La densità di popolazione è bassa in primavera (per aver sopportato tutta la mortalità invernale), e va recuperandosi lungo la stagione, raggiungendo il massimo nei mesi di settembre e ottobre. Essendo una specie che dipende dai gerani coltivati, nelle città e nei paesi può arrivare ad essere realmente abbondante in qualsiasi momento.

Habitat e comportamento. Si trova basicamente nei giardini, soprattutto in presenza di gerani, pianta della quale si alimenta. Può essere considerata una piaga dei gerani, potendo causare la morte delle piante. Si crede che venne introdotta nelle Baleari dal S.Africa, da dove proviene, e dalle Isole Baleari si sparse verso la Penisola Iberica e verso altri Paesi dell'Europa del sud.

Specie simili presenti a Minorca. Potrebbe arrivare a confondersi con *Leptotes pirithous*, però il dorso delle ali è marrone ed anche il disegno del rovescio delle ali è molto caratteristico. Se si osservano con attenzione, si possono distinguere abbastanza bene.

Cacyreus marshalli

