

## *Pararge aegeria* Linnaeus, 1758

Papallona del gram (ca.); Maculada, Mariposa de los muros (es.); Speckled Wood (en.)

**Distribuzione.** N Africa, Europa, Turchia e Asia temperata.

**Descrizione. Adulto.** 35-45 mm. Pagina superiore delle ali bruna, con cellette arancioni su tutta la superficie delle ali anteriori e che formano una striscia postdiscale sulle ali posteriori. Queste parti di color arancio contengono gli ocelli, uno subapicale in ciascuna delle ali anteriori e tre postdiscali nelle posteriori. Il disegno della pagina superiore segue sul rovescio delle ali anteriori con un contrasto di colori meno marcato, mentre sulle posteriori è piú indistinto, presentando sfumature di colori che si scuriscono e si schiariscono. L'area postdiscale presenta una striscia poco nitida di ocelli. **Bruco.** 28 mm. Color verde con peluria biancastra e linee longitudinali di color verde scuro, giallo e nero. Di aspetto fusiforme, con il capo sferico e due punte all'estremità addominale. Sverna in questo stadio. **Crisalidi.** 17mm. Di colore verde, restano appese mediante un cuscinetto di seta.



**Piante nutrici dei bruchi.** Varie specie di graminacee (*Brachypodium sylvaticum*, *Cynodon dactylon*,...)

### *Pararge aegeria* a Minorca

**Rappresentatività nel BMS.** Si tratta della specie piú abbondante di Minorca, rappresentando il 23% delle specie osservate nel BMS.

**Periodo de volo.** Specie polivoltina. Con generazioni successive che vanno intercalandosi. Vola in quasi tutte le epoche dell'anno. Sverna normalmente come larva e pupa, anche se è possibile vederla volare in alcune giornate soleggiate di inverno, riuscendo persino ad osservare alcune popolazioni nel mese di gennaio. È molto abbondante da marzo a ottobre, con una diminuzione in agosto e successivo recupero in settembre. L'abbondanza massima si registra a fine maggio - inizio di giugno.

**Habitat e comportamento.** Boschi chiusi. Specie tipicamente forestale. Si trova sempre lungo i bordi dei sentieri che attraversano i boschi e lungo le siepi. Frequenta gli ambienti ombreggiati. Ha un comportamento molto territoriale.



**Specie simili presenti a Minorca.** Si può confondere con *Lasiommata megera*, che però si trova in ambienti aperti, mentre *Pararge* preferisce luoghi piú ombrosi. Rispetto alle differenze morfologiche, la pagina inferiore dell'ala posteriore di *P. aegeria* è di colore bruno con venature giallastre e rossicce, mentre in *L. megera* è di color grigiaceo con strisce trasversali scure e sinuose, con una serie di piccoli ocelli postdiscali, formati da un punto nero centrale con pupilla bianca, attorno ad un solo anello. Sulla pagina superiore dell'ala posteriore *P. Aegeria* ha una macchia arancione, mentre *L. megera* presenta tutto un lato postdiscale di color arancio.

*Pararge aegeria*

