

Pyronia cecilia Vallantín, 1894

Grogueta (ca.) , Lobito jaspeado (es.), Southern Gatekeeper (en.)

Distribuzione. Marocco, Algeria, penisola Iberica ad eccezione della catena montuosa cantabrica, Baleari, parte dei Pirinei francesi e Alpi marittime, Italia, SE Balcani, O Grecia, NO Turchia.

Descrizione. Adulto. Pagina superiore delle ali di color arancione con il margine delle ali marrone. Un ocello con doppia pupilla bianca su ogni ala anteriore e le ali posteriori senza ocelli. Sul rovescio, le ali posteriori presentano tonalità chiare, in cui si combinano i grigi chiari con i marroni e dove spicca una sottile fascia biancastra discale. Forte dimorfismo sessuale: Maschi con macchia androconiale di colore marrone scuro solcata da venature arancio nelle ali anteriori e di dimensioni molto più ridotte rispetto alle femmine. **Bruco.** Color giallo pallido finemente punteggiato di nero con striscia laterale marrone chiaro vicino al capo e più scura verso la biforcazione caudale. **Crisalide.** Color marrone chiaro brillante.

Piante nutrici dei bruchi. Diverse specie di graminacee, soprattutto *Brachipodium retusum*.



Pyronia cecilia a Minorca

Rappresentatività nel BMS. Specie comune a Minorca. Nel BMS rappresenta il 5,6% delle specie osservate.

Periodo di volo. Univoltina, da fine maggio fino alla fine di agosto. Dapprima appaiono i maschi e più tardi le femmine. Sverna nello stadio di larva.

Habitat e comportamento. Boschi aperti e bassa montagna. Zone calde e secche con bassa vegetazione. L'habitat in cui è stata riscontrata maggiormente nel BMS è quello delle dune con vegetazione e in secondo luogo, ma con un'abbondanza molto inferiore, la brughiera di cisti ed erica. Presenta un volo basso e un comportamento molto timido; si nasconde rapidamente nell'ombra o sotto un cespuglio. Gli adulti si alimentano di *Limonium*, *Scabiosa*, *Pulicaria* e *Carlina*, a fioritura estiva.

Specie simili presenti a Minorca. Un osservatore poco esperto può confonderla con *Maniola jurtina*, però ci sono importanti differenze tra le due specie. Una differenza chiara è che *M. jurtina* ha solo un punto bianco sull'ocello dell'apice alare, mentre *P.cecilia* ha due punti bianchi in questo ocello. *M. jurtina* è di maggiori dimensioni.



Pyronia cecilia

