

*Leptidea sinapis* Linnaeus, 1758

Blanqueta (ca.); Blanca esbelta (es.); Wood white (en.)

**Distribuzione.** Ampiamente distribuita e comune in Europa al sud della latitudine 66° N, come pure nella maggior parte delle isole mediterranee. Non si trova in Scozia, Nord di Inghilterra, Olanda e Germania del Nord.

**Descrizione. Adulti.** 30-40 mm di apertura alare. Sono le più piccole della fam. *Pieridae*. Ali strette e bianche, di aspetto delicato. Presentano una macchia grigia sull'angolo esterno delle ali anteriori (apice), però questa macchia nelle femmine è assai poco definita. Il rovescio delle ali è anch'esso bianco, con le posteriori ombreggiate di grigio. L'insieme dell'antenna è nero con estremità marrone e macchia ventrale bianca. Addome lungo e fino spolverato di bianco. **Bruchi.** 16-18 mm. Color verde con punti verdi più scuri con una linea laterale longitudinale bianca. Presentano numerosi peli corti e di colore bianco che si ingrandiscono alle estremità. Sono molto passivi, si muovono poco. **Crisalidi.** 15mm. Sono di color verde pallido con una linea longitudinale laterale bianca. Sono allungate, con le estremità appuntite e si appendono allo stelo della pianta nutrice mediante una cinturina di seta all'altezza del torace e per mezzo del cremaster a un cuscinetto di seta. Le crisalidi dell'ultima generazione svernano.

**Piante nutrici.** Le larve si alimentano di diverse specie di leguminose, specialmente la veccia (*Vicia spp.*), come pure *Lathyrus spp.* e *Lotus spp.*.


*Leptidea sinapis* a Minorca

**Rappresentatività nel BMS.** Specie che per il momento è rappresentata molto scarsamente nei sopralluoghi del percorso BMS. Non era mai apparsa prima di aggiungere alla rete BMS la stazione di Sta. Catalina, dove possiamo trovare un ambiente di tipo forestale.

**Periodo di volo.** Sembra che sia una specie con due generazioni, una in maggio più numerosa e una seconda il luglio-agosto. I discendenti della seconda generazione svernano sotto forma di crisalide. A causa della scarsità di osservazioni realizzate fino ad oggi, non si dispone della curva di volo.

**Habitat e comportamento.** Boschi chiusi. Si sono potute osservare solo in zone boschive, nei querceti. Volano lentamente, senza elevarsi molto, e si posano frequentemente.

**Specie simili presenti a Minorca.** Nel 1988 si constatò che la farfalla che fino ad allora era stata chiamata *L.sinapis* corrispondeva in realtà a due specie distinte: *L.sinapis* e *L.reali*, il che indica la difficoltà di distinguere visualmente una specie dall'altra; sembra però che *L.reali* preferisca ambienti di mezza montagna, per cui è più che probabile che non si trovi a Minorca. Non se ne è riscontrata la presenza nemmeno a Maiorca. Per quanto riguarda le similitudini con le specie che possiamo trovare a Minorca, può essere confusa con *Pieris rapae* o *Pieris napi*, anche se non ha il colore giallastro della *Pieris* e, d'altro canto, ha le ali più strette e non presenta le macchie scure nella parte centrale delle ali anteriori..



*Leptidea sinapis*



Fotografia: José Manuel Sesma



Fotografia: Pep Monteverde



Fotografia: José Manuel Sesma