

Pieris rapae Linnaeus, 1758

Blanqueta de la ravenissa (ca.), Blanquita de la col (es.), Small white (en.)

Distribuzione. Ampiamente distribuita e comune. N Africa, Europa e Asia. Ben stabilita e molto abbondante nelle Baleari.

Descrizione. Adulto. 45-50 mm di apertura alare. La pagina superiore delle due paia di ali è di colore biancastro con varie macchie nere: due nelle ali anteriori e una laterale nelle posteriori. Il margine apicale delle ali superiori è di colore nero. La pagina inferiore delle ali posteriori è giallastra, mentre quella delle ali anteriori è bianca, e solo il margine superiore è macchiato di giallo. La differenza sessuale si trova nei due punti neri che presentano le femmine nelle ali superiori, mentre il maschio ne è privo o ne tiene solo uno. **Bruco.** 25-30 mm di lunghezza. Verdastro, finemente punteggiato di nero, linea dorsale giallastra e latero-ventrale con punti bianchi o giallastri separati tra loro. Le larve non sono gregarie e si possono trovare esemplari di varie femmine o di varie deposizioni sulla stessa pianta. **Crisalide** 23-25 mm. Si appende a pareti, pietre o tronchi mediante un filo di seta all'altezza del torace. Aspetto spigoloso, colorazione verde od ocrea con protuberanze e ariste marroni.

Piante nutrici dei bruchi. Crucifere, per le quali può arrivare ad essere una vera piaga, siano esse specie coltivate o selvatiche.



Pieris rapae a Minorca

Rappresentatività nel BMS. Si tratta di una specie molto abbondante sull'isola. È la quinta più numerosa nella rete BMS e rappresenta l' 8,7% delle specie osservate.

Periodo di volo. Polivoltina. È uno dei primi ropaloceri che si vede volare in primavera e si mantiene fino ad autunno inoltrato. La massima abbondanza si registra verso fine giugno e inizio di luglio. Sverna come crisalide. Presenta forti tendenze migratorie.

Habitat e comportamento. Gli ambienti che frequenta sono i boschi aperti, montagne basse, campi ed orti. L'habitat in cui si trova con più facilità a Minorca è rappresentato dalle macchie di olivastro e lentisco.

Specie simili presenti a Minorca. Gli esemplari di Minorca presentano dimensioni maggiori di quelle abituali, specialmente all'inizio della stagione, quando si può arrivare a confonderli con *Pieris brassicae*. Con l'avanzare della stagione, le generazioni sono di dimensioni inferiori e si differenziano da *P. brassicae*, soprattutto per la tonalità giallastra sul rovescio, che si fa più evidente. Un'altra differenza è la macchia nera, più intensa, più estesa e che arriva più giù lungo il margine dell'ala nella specie *P. brassicae*.



Pieris rapae

